

شرح حالات الخرف النادر...

للمزيد من المعلومات، زوروا موقع www.raredementiasupport.org

الخرف الجبهي الصدغي (FTD)



هو مجموعة من أنواع الخرف التي تؤثر بشكل رئيسي على الشخصية والسلوك أو اللغة والكلام، بسبب تلف الجزء الأمامي أو جانبي الدماغ.

يسمى الخرف المؤثر على السلوك بالخرف الجبهي الصدغي متغير السلوك أو bvFTD.

- الأعراض السائدة الرئيسية هي • غياب التحفظ في السلوك أو التعبير • فقدان الحافز
- الهواجس والأفعال القهرية • تغيرات الشهية • فقدان الشعور بالتعاطف
- صعوبة التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرارات

تسمى حالة اضطرابات النطق والكلام الحبسة التقدمية الأولية أو PPA.

الخرف الجبهي الصدغي العائلي (fFTD)

لدى حوالي 30-40٪ من الذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف الجبهي الصدغي تاريخ للحالة في عائلاتهم وعلى الأغلب يكون سببه وراثيًا – لذلك يُسمى بالخرف الجبهي الصدغي العائلي (fFTD). من بين الأشكال المختلفة للخرف الجبهي الصدغي، يعتبر متغير السلوك هو الأكثر تورطًا. ويمكن أيضًا أن يكون للحبسة التقدمية الأولية خاصّة المصحوبة بفقد الطلاقة، سببًا وراثيًا وتاريخًا عائليًا ولكنها أكثر ندرة.

الحبسة التقدمية الأولية (PPA)



هو مصطلح يشير إلى مجموعة من حالات الخرف التي تؤثر على الكلام واللغة.

- الأشكال الثلاثة الرئيسية هي • الحبسة التقدمية المصحوبة بفقد الطلاقة
- مشاكل في النطق والتأثير على بناء الجملة

Contact@raredementiasupport.org


شرح أنواع الخرف النادر...



الضمور القشري الخلفي (PCA)

هو نوع نادر من الخرف قد يسبب بدايةً مشاكل في البصر مصدرها انكماش في الجزء الخلفي من الدماغ (البصر النابع من الدماغ وليس العين).

- تشمل الأعراض: مشاكل بصرية ومكانية في رؤية الشيء والتعرف على مكانه ● صعوبة في الحساب والتهجئة والكتابة
- صعوبة في السمع والشعور بأماكن الأشياء
- تشمل الصعوبات المبكرة: فقدان التركيز عند القراءة ● صعوبات في القيادة وصف السيارة ● مشاكل بصرية في العمل



مرض ألزهايمر العائلي (FAD)

هو نوع وراثي من مرض ألزهايمر سببه خطأ وراثي متناقل في العائلات. عادةً ما تظهر الأعراض على المصابين بـFAD لأول مرة قبل سن الـ65، غالبًا في الأربعينات والخمسينات. وتكون الأعراض الأولية لـFAD مشابهة لأعراض مرض ألزهايمر النموذجي - بالأخص فقدان الذاكرة.

مرض ألزهايمر المبكر (YOAD)

يعتبر الكثيرون مرض ألزهايمر على أنه مرض يصيب كبار السن، ولكن الحقيقة أن حوالي 5% من المصابين به تقل أعمارهم عن 65 عاماً. لهذا يطلق عليه مرض ألزهايمر المبكر. وهو يؤثر في العادة على من هم في الأربعينات والخمسينات وأوائل الستينات من العمر. وسببه في معظم الحالات غير وراثي. من الأعراض السائدة لهذا المرض تغيرات واضحة في اللغة أو الإدراك أو السلوك بالإضافة إلى ضعف الذاكرة.

Contact@raredementiasupport.org



خرف أجسام ليوي (LBD)

هو مصطلح واسع يشمل الخرف المصحوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون.

تشمل الأعراض الرئيسية • تغيرات في التفكير والاستدلال، لا سيما القائم على الحكم البصري

• تذبذب التفكير والذاكرة (تختلف المشاكل من يوم لآخر أو حتى من ساعة لأخرى) • الهلوسة البصرية (رؤية أشياء غير موجودة)

• تغيرات في الحركة مثل البطء والتصلب والسقوط • اضطراب النوم الذي ينطوي على تمثيل الأحلام

Contact@raredementiasupport.org