

罕见痴呆症 释义

更多信息请访问网站www.raredementiasupport.org



额颞叶型痴呆症（FTD）

此类型以侵犯脑前部的额叶及两侧的颞叶为主，因此影响范围主要为人格和行为转变，以及语言出现障碍。影响行为的临床表型称为**行为异常型额颞叶痴呆**，简称bvFTD。

FTD的六个主要症状为 ● 自制力退化 ● 生活动力丧失

- 难以控制痴迷与冲动 ● 食欲变化 ● 失去共情能力
- 规划、解决问题及作出决定的能力减退

影响语言和话语能力的表型称为**原发性进行性失语症**，简称PPA。

家族性额颞叶型痴呆症（fFTD）

在确诊为额颞叶型痴呆症的人中，约30-40%有家族病史，并且很可能有遗传因素，我们称此为家族性FTD（fFTD）。在各类型的FTD之中，最常受到遗传的是**行为异常型**。原发进行性失语症，尤其是进行性非流利失语症，亦有可能在家族中遗传，但较为罕见。



原发进行性失语症（PPA）

这类型痴呆症会影响患者的说话及语言能力。

可分为三大种类 ● 进行性非流利失语症：难以流畅说话，造句能力受影响

- 语意型痴呆：字词理解上有困难
- 缺词型：这种进行性失语会影响提取词汇的能力

contact@raredementiasupport.org

Images ©2024 Alzheimer's Association. www.alz.org. All rights reserved. Illustrations by Stacy Jannis.



后部皮质萎缩（PCA）

这是一种罕见的痴呆症。这种病变是由于脑后部缩小，而首先导致视觉问题（并非视力问题）。

症状包括 ● 视觉及空间感问题，影响识别物体及其位置 ● 运算、拼写及书写困难
● 难以聆听和感觉物品的位置

早期问题包括：文字阅读位置错乱 ● 开车和停车困难 ● 工作时出现视觉问题



家族性阿尔茨海默病（FAD）

这是一种遗传型阿尔茨海默病，由一个家族遗传的基因缺陷引起。FAD患者通常在65岁以前就发病，最常于40多或50多岁间出现症状。FAD的初始症状一般与常见的阿尔茨海默病类似，主要为记忆丧失。

早发型阿尔茨海默病（YOAD）

虽然阿尔茨海默病一般都被视为老人病，但大约5%的患者为65岁以下。这一型称为早发型阿尔茨海默病，患者通常为40多、50多岁或60出头。早发型阿尔茨海默病绝大多数都并非遗传，患者较可能出现明显的语言、感知或行为变化，以及记忆方面的问题。



路易体痴呆症（LBD）

这是一个统称，涵盖路易体痴呆症及帕金森病痴呆症。

主要症状包括 ● 思考和推理能力出现变化，尤其是涉及视觉判断时 ● 思考和记忆能力起伏不定（每日甚至每小时表现都不同） ● 幻视（看见不存在的事物） ● 动作转变如变慢、僵硬及跌倒 ● 睡着时随梦境而行动的睡眠障碍

contact@raredementiasupport.org

Images ©2024 Alzheimer's Association. www.alz.org. All rights reserved. Illustrations by Stacy Jannis.