

редких формах деменции...

Дополнительная
информация доступна по ссылке: [::www.raredementiasupport.org](http://www.raredementiasupport.org)



Лобно-височная деменция (ЛВД)

Лобно-височная деменция объединяет несколько форм деменции, вызванных поражением лобных и височных долей головного мозга и характеризующихся расстройством личности, нарушением речи и поведенческими изменениями. Поведенческой формой является поведенческий вариант лобно-височной деменции или поведенческий (лобный) вариант ЛВД.

Существует шесть основных симптомов ЛВД:

- неприемлемое поведение • потеря мотивации • компульсивное поведение • изменение пищевых привычек • утрата эмпатии • трудности с планированием, решением задач и принятием решений

Языковой формой заболевания является первичная прогрессирующая афазия или ППА.

Семейная форма лобно-височной деменции (семейная форма ЛВД)

От 30 до 40% случаев лобно-височной деменции носят наследственный характер. В таких случаях человек, скорее всего, имеет генетическую предрасположенность к заболеванию — такой вид патологии является семейной формой ЛВД. Среди различных форм ЛВД поведенческий вариант наследуется чаще всего. Диагноз первичной прогрессирующей афазии, и особенно прогрессирующей афазии со снижением беглости речи, также может означать генетическую предрасположенность к заболеванию и носить наследственный характер, но семейные формы этих болезней встречаются гораздо реже.

contact@raredementiasupport.org



Первичная прогрессирующая афазия (ППА)

Первичная прогрессирующая афазия представляет собой группу форм деменции, нарушающих речь человека.

СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ППА: • Прогрессирующая афазия со снижением беглости речи — вызывает проблемы с использованием речи и построением предложений • Семантическая деменция — затрудняет понимание значений слов • Логопеническая прогрессирующая афазия — нарушает процесс подбора слов

О РЕДКИХ ВИДАХ ДЕМЕНЦИИ...



ЗАДНЯЯ КОРКОВАЯ АТРОФИЯ (ЗКА)

ЗКА является редкой формой деменции, которая на раннем этапе развития может вызывать проблемы со зрением из-за уменьшения объема затылочной доли головного мозга (то есть, на ухудшение зрения влияет нарушение работы зрительной коры головного мозга, а не глаз).

СРЕДИ СИМПТОМОВ ЗКА МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:

- проблемы со зрением и пространственной ориентацией (человеку трудно понять, что и где находится)
- трудности с подсчетом, правописанием и письмом
- проблемы со слухом и ощущением местонахождения предметов

НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИСПЫТЫВАТЬ:

- снижение концентрации при чтении
- трудности с вождением и парковкой
- проблемы со зрением на работе



Семейная форма болезни Альцгеймера (семейная форма БА)

Семейная форма БА является наследственной формой болезни Альцгеймера, которая вызывается генетической предрасположенностью. У людей с семейной формой БА первые симптомы обычно проявляются до достижения 65 лет, чаще всего в возрасте от 40 до 59 лет. Начальные симптомы семейной формы БА, как правило, схожи с типичными


contact@raredementiasupport.org

симптомами болезни Альцгеймера — в первую очередь это ухудшение памяти.

Болезнь Альцгеймера с ранним началом

Хотя часто считается, что болезнью Альцгеймера страдают исключительно пожилые люди, около 5% людей с болезнью Альцгеймера моложе 65 лет. Таким людям ставят диагноз болезни Альцгеймера с ранним началом. Обычно она затрагивает людей в возрасте от 40 до 64 лет.

В большинстве случаев это заболевание не носит наследственный характер. У людей с болезнью Альцгеймера с ранним началом чаще всего наблюдаются заметные нарушения речи и поведения, утрата навыков ориентации, а также ухудшение памяти.



ДЕМЕНЦИЯ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ (ДТЛ)

ДТЛ относится к той же группе заболеваний, что и деменция при болезни Паркинсона.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ ДТЛ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:

- изменения в мыслительных процессах и рассуждениях
- расстройства мыслительных процессов и памяти (состояние человека может меняться от дня ко дню или даже от часа к часу)
- зрительные галлюцинации (человек видит то, чего нет на самом деле)
- трудности с движением, например, медлительность, скованность и падения
- расстройства сна, включающие в себя разыгрывание снов наяву

contact@raredementiasupport.org